


ALGORYTM OCENY, LECZENIA I SKIEROWANIA PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO APTEK Z OBJAWAMI ZAPARĆ

PACJENCI Z OBJAWAMI ZAPARĆ W APTECE



a - Nastroj (spity/zrelaksowany), poziom zdrowia fizycznego i mentalnego odpowiedni dla wieku pacjenta.
b - Możliwe samoleczenie (przy uwzględnieniu potrzeb pacjenta).
c - >5% masy ciała lub >3kg w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.
d - Możliwa jednokrotna zmiana terapii (po sprawdzeniu, czy występują "czerwone flagi").

BISAKODYL – PIERWSZY WYBÓR W ŁAGODZENIU ZAPARCIA OKAZJONALNEGO¹

DLACZEGO WARTO POLECIĆ DULCOBIS SWOIM PACJENTOM?



**Brak efektu
przyzwyczajania³**



**Skuteczność
utrzymuje się
w czasie⁴**

94% pacjentów
kontynuowało stosowanie
tej samej dawki przez rok
bez oznak przyzwyczajania



**Pobudza naturalny
proces wypróżnień²**

Bisakodyl

Zaparcia okazjonalne

Makrogol 4000

Zaparcia przewlekłe



LEK OTC



Dostępny w formie
tabletek i czopków²



Tabletki - ulga już
po 6h²
Czopki - ulga już
po 10 min.²



Możliwość stosowania
w przygotowaniu
do badań
diagnostycznych²



Dostępny w płynie²



Do wymieszania
z każdym napojem,
bez wpływu na smak²



Odpowiedni dla osób
starszych i dzieci
od 6. miesiąca życia²

WYRÓB MEDYCZNY

1. Brenner D. et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2024;22(2):397-412. Lekami pierwszego wyboru są glikol polietylenowy i stymulujące środki przeczyszczające, do których należy bisakodyl. 2. Bisakodyl pobudza naturalny proces wypróżnienia. ChPL Dulcobis tabletki 01.2025 i czopki 01.2025. DulcoSoft SIP 05.2023. 3. Bove A. et al. World J Gastroenterol. 2012;18:4994-5013. 4. Bouchoucha M. et al. A Retrospective Real-World Observational Study Assessing the Evolution of Bisacodyl Prescriptions in Patients with Constipation During Long-Term Treatment. Drugs - Real World Outcomes. 2023; 10, 249-261.

