

Podejrzewasz u pacjenta zaparcie?



Rekomendacja krok po kroku

Dulcobis®
Bisacodylum



Informacje o leku

1 ZACZNIJ OD WYWIADU:

Jaki jest stan zdrowia pacjenta?

Od ilu dni pacjent nie może się wypróżnić?

Jakich objawów doświadcza -
wzdęcia, twarde stolce, nadmierne
napinanie?

Niepokojące objawy: ból brzucha,
wymioty, gorączka, krew w stolcu,
utrata masy ciała.

2 NA TO ZWRÓĆ UWAGĘ:

Jakie leki przyjmuje?

Leki, których stosowanie może
powodować zaparcie to¹⁻³:

ANALOGI GLP-1

OPIOIDY

NLPZ

ANTYCHOLINERGICZNE

ANTYHISTAMINOWE

ANTYDEPRESANTY

ŻELAZO

3 DOBIERZ PRODUKT:

Jakiego rozwiązania potrzebuje?

W jakim wieku jest pacjent
z zaparciem?

Jak często występuje problem
z wypróżnianiem?

Jaką formę leku preferuje?

4 ZAREKOMENDUJ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE:

Czopki

BISAKODYL



Szybka ulga po 10 min.⁴



Działają miejscowo⁴



Pobudzają naturalny
proces wypróżnienia⁴



Od 10. roku życia⁴

Tabletki

BISAKODYL



Poranna ulga po 6 godz.⁵



Potwierdzony brak
efektu przyzwyczajania⁶



Małe tabletki - łatwe
do połknięcia⁵



Od 4. roku życia⁵

Roztwór

MAKROCOL 4000



Łagodne działanie⁷



Wsparcie przy zaparciu
przewlekłym⁷



Bez smaku, cukru,
glutenu⁷



Powyżej 6. mies. życia⁷

1. Diaz S, et al. Constipation. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513291/> (Accessed January 2025). 2. Liu et al. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Dec 7;13:1043789. 3. Bloor, S. R., Schutte, R., & Hobson, A. R. (2021). Oral iron supplementation-gastrointestinal side effects and the impact on the gut microbiota. Microbiology Research, 12(2), 491-502. 4. ChPL Dulcobis czopki 01.2025; 5. ChPL Dulcobis tabletki, 01.2025; 6. Bouchoucha M, et al. Drugs Real World Outcomes. 2023;10(2):249-261. 7. Instrukcja używania Dulcosoft roztwór 04.2024.